

Lefax[®]

Kautabletten

Wirkstoff: Simeticon 42 mg

Gebrauchsinformation

www.lefax.de



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Lefax Kautabletten* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden. □

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. □
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. □
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen □ Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. □ Was ist *Lefax Kautabletten* und wofür wird es angewendet?
2. □ Was müssen Sie vor der Einnahme von *Lefax Kautabletten* beachten?
3. □ Wie ist *Lefax Kautabletten* einzunehmen?
4. □ Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. □ Wie ist *Lefax Kautabletten* aufzubewahren?

Lefax[®] Kautabletten

Wirkstoff: Simeticon 42 mg

Glycerolmonostearat, Fenchelöl, Pfefferminzöl, Kümmelöl.

Hinweis für Diabetiker: 1 Kautablette enthält 0,05 Broteinheiten (BE).

Zusammensetzung:

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Simeticon.
1 Kautablette enthält 42mg Simeticon.
Die sonstigen Bestandteile sind: Glucose, Sucrose,

Darreichungsform und Inhalt:

Lefax Kautabletten ist in Packungen mit 20, 50 oder 100 Kautabletten erhältlich.

1. Was ist *Lefax Kautabletten* und wofür wird es angewendet?

Lefax Kautabletten ist ein entzündungswirkendes Arzneimittel.

von: Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen
hergestellt von: AMAREG GmbH,
Donaustraße 378, 93055 Regensburg

Lefax Kautabletten wird angewendet:

- □ bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung □

- im Magen-Darm-Bereich.
- □ bei funktionellen Beschwerden im Magen-Darm- □ Bereich wie Völlegefühl, vorzeitiges Sättigungsgefühl, □ Blähungen, Aufstoßen, Meteorismus (Darmkollern, □ Abgang von Darmgasen).
- □ bei verstärkter Gasbildung nach Operationen.
- □ zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im □ Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten □ (Sonographie, Röntgen).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Lefax Kautabletten* beachten?

Lefax Kautabletten darf nicht eingenommen werden wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Simeticon oder einem der sonstigen Bestandteile von *Lefax Kautabletten* sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Lefax Kautabletten* ist erforderlich:

Bei neu auftretenden und/oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine unter Umständen zugrundeliegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von *Lefax Kautabletten* während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von *Lefax Kautabletten*

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose und Glucose. Bitte nehmen Sie *Lefax Kautabletten* daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

1 Kautablette enthält 0,3 g Glucose und 0,25 g Sucrose (Zucker) entsprechend ca. 0,05 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Lefax Kautabletten kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

3. Wie ist *Lefax Kautabletten* einzunehmen?

Nehmen Sie *Lefax Kautabletten* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nehmen Sie die Kautabletten zu oder nach den Mahlzeiten und bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen ein. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Kautabletten gut **zerkaut** werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Kinder 6 - 14 Jahre	1 - 2 Kautabletten (entsprechend 42 bis 84 mg Simeticon)	4 - 8 Kautabletten (entsprechend 168 bis 336 mg Simeticon)
Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene	1 - 2 Kautabletten (entsprechend 42 bis 84 mg Simeticon)	4 - 8 Kautabletten (entsprechend 168 bis 336 mg Simeticon)

Für jüngere Kinder und Säuglinge stehen andere Darreichungsformen zur Verfügung.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Sie können *Lefax Kautabletten*, falls erforderlich, auch über längere Zeit einnehmen.

Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen beträgt die empfohlene Dosierung 3mal täglich 2 Kautabletten (252 mg Simeticon) am Tag vor der Untersuchung und 2 Kautabletten (84 mg Simeticon) am Morgen des Untersuchungstages.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Lefax Kautabletten* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge *Lefax Kautabletten* eingenommen haben als Sie sollten

Vergiftungen durch *Lefax Kautabletten* sind bisher nicht bekannt. Der Wirkstoff Simeticon wird nicht in die Blutbahn aufgenommen. Auch große Mengen *Lefax Kautabletten* werden problemlos vertragen.

Wenn Sie die Einnahme von *Lefax Kautabletten* vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit *Lefax Kautabletten* abgebrochen wird

Die Beschwerden können wieder auftreten.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von *Lefax Kautabletten* sind bisher nicht bekannt geworden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bei sich bemerken.

5. Wie ist *Lefax Kautabletten* aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: Mai 2005

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister bzw. Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Bayer